

Bepanthen®

UNGUENT PENTRU RÂNI ȘI VINDECARE

50 mg/g unguent

Dexpanthenol



Citiți întregul prospect cu atenție înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece el conține informații importante.

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

// Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să îl recitiți.

// Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.

// Dacă manifestați orice reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

[Vezi secțiunea 4.](#)

// Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează după 7 zile sau chiar se agravează, adresați-vă medicului.

// Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează după 7 zile sau chiar se agravează, adresați-vă medicului.

Ce conține acest prospect

1. **Ce este Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată și pentru ce se utilizează?** >

2. **Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?** >

3. **Cum se utilizează Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?** >

4. **Ce reacții adverse sunt posibile?**

5. **Cum se păstrează Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?** >

6. **Conținutul ambalajului și alte informații**

7. **Ce conține Acest prospect**

8. **Conținutul ambalajului și alte informații**

1. Ce este Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată și pentru ce se utilizează?



Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE este un medicament utilizat pentru susținerea procesului de vindecare a rănilor.

Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE se utilizează:

– pentru susținerea vindecării leziunilor superficiale ușoare ale pielii și mucoaselor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?



Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE nu trebuie utilizat

dacă sunteți alergic(ă) la dexpanthenol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament, enumerate la pct. 6.

Atenționări și precauții

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție în cazul utilizării corecte a Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE.

Se va evita contactul cu ochii.

Atenționare:

În cazul tratamentului cu Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE în zona genitală sau anală, utilizarea concomitentă a unor produse (de exemplu, prezervative din latex) poate fi afectată din cauza prezenței anumitor componente auxiliare.

...din latex (de exemplu, prezervative, diafragme) poate duce la **reducerea rezistenței la rupere și/sau la compromiterea siguranței** acestora.

Utilizarea Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE împreună cu alte medicamente

Până în prezent **nu sunt cunoscute interacțiuni medicamentoase.**

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

În timpul **sarcinii și alăptării**, nu există restricții privind utilizarea Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE.

Nu sunt disponibile date referitoare la **fertilitate.**

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu sunt necesare **măsuri speciale de precauție.**

Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE conține **ceară de lână (lanolină), alcool stearilic și alcool cetilic.**

Ceara de lână (lanolina), alcoolul stearilic și alcoolul cetilic pot provoca **reacții cutanate locale**, cum ar fi **iritarea pielii** (de exemplu, **dermatita de contact**).

Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE conține **ceară de lână (lanolină), alcool stearilic și alcool cetilic.**

Ceara de lână (lanolina), alcoolul stearilic și alcoolul cetilic pot provoca **reacții cutanate locale**, cum ar fi **iritarea pielii** (de exemplu, **dermatita de contact**).

3. Cum se utilizează Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?



Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau conform indicațiilor medicului sau farmacistului dumneavoastră. Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă nu sunteți sigur(ă).

Doza recomandată este:

Aplicați Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE în strat subțire pe zonele de piele afectate, o dată sau de mai multe ori pe zi, în funcție de necesități.

Durata tratamentului

Durata tratamentului depinde de tipul și evoluția afecțiunii.

Vă rugăm să discutați cu medicul sau farmacistul dacă aveți impresia că efectul Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE este prea puternic sau prea slab.

Dacă aveți alte întrebări privind utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului.

4. Ce reacții adverse sunt posibile?

Ca toate medicamentele, și acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

În cadrul utilizării Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE, după autorizarea de punere pe piață, au fost identificate următoarele reacții adverse. Deoarece aceste reacții au fost raportate voluntar de grupuri de pacienți de dimensiuni necunoscute, **frecvența lor nu poate fi estimată cu exactitate.**

Reacții adverse importante sau semne la care trebuie să fiți atent(ă) și măsuri de urmat dacă apar:

Dacă manifestați una dintre reacțiile adverse enumerate mai jos, nu mai utilizați Bepanthen® UNGUENT PENTRU RĂNI ȘI VINDECARE și adresați-vă cât mai curând posibil medicului dumneavoastră.

Afecțiuni ale sistemului imunitar și afecțiuni ale pielii și ale țesutului subcutanat

Frecvență necunoscută (nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile):

Reacții alergice și reacții alergice cutanate, cum ar fi, de exemplu:

dermatită de contact, dermatită alergică, mâncărime (prurit), roșeață, eczemă, erupții cutanate, urticarie, iritații ale pielii și vezicule (bășici).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă observați reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect.

5. Cum se păstrează Bepanthen® Unguent pentru răni și piele iritată?



Păstrați acest medicament în locuri inaccesibile copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe plierea tubului și pe cutia exterioară. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii menționate.

Condiții de păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Mențiune privind valabilitatea după deschidere

Bepanthen® WUND- UND HEILSALBE este valabil 3 luni după deschidere.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Bepanthen® WUND- UND HEILSALBE

Substanța activă este: dexpanthenol.

1 g de unguent conține 50 mg dexpanthenol.

Celelalte componente sunt:

ceară albită, parafină vâscoasă, parafină fluidă, vaselină albă, amestec de ceresină–glicerol monooleat (vegetal)–alcooli din ceară de lână (Protegin X), vaselină albă, alcool cetilic (Ph. Eur.), alcool stearilic (Ph. Eur.), ceară de lână, ulei de migdale, apă purificată.

Cum arată Bepanthen® WUND- UND HEILSALBE și conținutul ambalajului

Bepanthen® WUND- UND HEILSALBE este un unguent galben-pal, omogen și este disponibil în tuburi cu 20 g, 50 g și 100 g de unguent.

Alternativ pentru 3,5 g:

Bepanthen WUND- UND HEILSALBE este un unguent galben-pal, omogen și este disponibil în tuburi cu 3,5 g, 20 g, 50 g și 100 g de unguent.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Bayer Vital GmbH

51368 Leverkusen, Germania

Telefon: (0214) 30 51 348

Telefax: (0214) 30 51 603

E-mail: medical-information@bayer.com ↗

Producător

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Straße 7

79639 Grenzach-Wyhlen, Germania

www.bepanthen.de ↗

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în februarie 2018.

LMR-CH-20210429-75

Bayer
